

Correction des exercices sur la notion de fonction composée

Exercice 1

1. Donner le schéma de composition, c'est identifier les fonctions u et v telles que $f(x) = v(u(x))$, autrement dit identifier la fonction « de l'intérieur » u et la fonction « de l'extérieur » v .

Ici, en posant $u(x) = -x + 3$ et $v(x) = x^4$, on a bien $f(x) = v(u(x))$.

2. Les deux fonctions u et v sont définies sur $\mathbb{R}$, donc f est **définie sur** $\mathbb{R}$.

Exercice 2

$g \circ f(1) = g(f(1))$. Or $f(1) = \sqrt{x+1} = \sqrt{2}$ puis $(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Donc $f(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$f \circ g(3) = f(g(3))$. Or $g(3) = \frac{1}{3}$ puis $f(1) = \sqrt{\frac{1}{3}+1} = \sqrt{\frac{4}{3}}$. Donc $f \circ g(3) = \sqrt{\frac{4}{3}}$ (ou $\frac{2}{\sqrt{3}}$ si vous préférez)

Exercice 3

1. On pose $u(x) = x^2 - 8x + 15$ et $v(x) = \sqrt{x}$. On a bien $f(x) = v(u(x))$.

2. La racine carrée n'est définie que pour les nombres positifs. Il faut donc étudier le signe du polynôme $u(x)$.

Son discriminant est $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 1 \times 15 = 64 - 60 = 4$.

Ses racines sont $x_1 = \frac{-(-8)+\sqrt{4}}{2 \times 1} = 5$ et $x_2 = \frac{-(-8)-\sqrt{4}}{2 \times 1} = 3$.

Le signe de $a = 1$ étant positif, on peut dresser le tableau de signe de $u(x)$ et établir qu'il est positif sur $]-\infty; 3] \cup [5; +\infty[$. Ainsi, f est **définie sur** $]-\infty; 3] \cup [5; +\infty[$.

Exercice 4

On lit $f(2) = 4$ puis $g(4) = 2$. Ainsi, $g \circ f(2) = 2$.

On lit $g(2) = 1$ puis $f(1) = 1$. Ainsi, $f \circ g(2) = 1$.

Correction des exercices sur les dérivées des composées usuelles

Exercice 1

a. D'après le tableau des composées, la dérivée d'une fonction de la forme e^u est $u'e^u$.

Pour x réel, on pose $u(x) = 4x^3 + x$. Sa dérivée est $u'(x) = 12x^2 + 1$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = (12x^2 + 1)e^{4x^3+x}$. On n'oublie pas la parenthèse de $u'(x)$!

b. La dérivée d'une fonction de la forme $\cos(u)$ est $-u' \times \sin(u)$.

Pour x réel, on pose $u(x) = 3x^2 + 1$. Sa dérivée est $u'(x) = 6x$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = -6x \times \sin(3x^2 + 1)$.

c. La dérivée d'une fonction de la forme $\sqrt{u}$ est $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Pour x réel, on pose $u(x) = 8x - 3$. Sa dérivée est $u'(x) = 8$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = \frac{8}{2\sqrt{8x-3}} = \frac{4}{\sqrt{8x-3}}$ après simplification.

d. Il s'agit ici d'un produit entre $u(x) = x^2$ qui a pour dérivée $u'(x) = 2x$

et $v(x) = e^{3x+1}$ qui est une fonction composée et qui a pour dérivée $v'(x) = 3e^{3x+1}$ d'après la formule.

Ainsi, $f'(x) = 2x \times e^{3x+1} + x^2 \times 3e^{3x+1} = 2xe^{3x+1} + 3x^2e^{3x+1}$

On peut ensuite factoriser par e^{3x+1} : $f'(x) = e^{3x+1}(2x + 3x^2)$ puis par x : $f'(x) = xe^{3x+1}(2 + 3x)$.

e. La dérivée d'une fonction de la forme u^5 est $5u'u^4$.

Si on pose $u(x) = 3e^{-2x} + 1$, on a alors $u'(x) = 3 \times (-2e^{-2x}) = -6e^{-2x}$ (u contient elle-même une composée).

Ainsi, $f'(x) = 5 \times (-6e^{-2x}) \times (3e^{-2x} + 1)^4 = -30e^{-2x}(3e^{-2x} + 1)^4$

Exercice 2

1. Il s'agit d'un produit, et l'un des facteurs est une composée.

On pose pour tout t positif, $u(t) = t^2 + 20t$, on a alors $u'(t) = 2t + 20$.

On pose aussi $v(t) = e^{-t-1}$ et ainsi $v'(t) = -e^{-t-1}$.

On dérive la fonction p sans oublier de tout multiplier par 100 :

$$p'(t) = 100((2t + 20)e^{-t-1} + (t^2 + 20t) \times (-e^{-t-1}))$$

Ensuite, on factorise par l'exponentielle, en faisant attention au $-$ dans le deuxième produit.

$$p'(t) = 100(e^{-t-1}(2t + 20 - t^2 - 20t))$$

$$p'(t) = 100e^{-t-1}(-t^2 - 18t + 20)$$

2. Le signe de cette dérivée ne dépend que du polynôme, on calcule son discriminant et on trouve ses racines, qui sont environ $-19,05$ (qui est hors de l'intervalle) et $1,05$.

Ainsi, on trouve que $p'(t)$ est positif sur $[0; 1,05]$ puis négatif sur $[1,05; +\infty[$ et p est croissante sur $[0; 1,05]$ puis décroissante sur $[1,05; +\infty[$.

Le nombre maximal de malades est donc atteint **au bout d'environ 1,05 semaines**.

Il est égal à environ $f(1,05) \approx 285$.

